


NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE

UWAGA!

Ten lek Sildenafil Dr. Max przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek jest dla Ciebie, jeżeli jesteś dorosłym (≥ 18. r. ż.) mężczyzną, a problemy ze wzrodem utrudniają Ci współżycie płciowe. Jeżeli nie spełniasz przynajmniej jednego z powyższych warunków, ten lek NIE jest dla Ciebie!

Czy stosujesz leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej), których przyjmowanie wraz z lekiem Sildenafil Dr. Max może zagrozić Twojemu życiu ?		TAK	NIE WIEM	NIE
1. nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit)		☐	☐	☐
2. izosorbid (np. Effox, Mono Mack, Monosan, Olicard)		☐	☐	☐
3. pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol com positum)		☐	☐	☐
4. molsidominę (np. Molsidomina WZF)		☐	☐	☐
5. nikorandyl (np. Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma)		☐	☐	☐
6. sakubitril w połączeniu z walsartanem (np. Entresto, Neparvis)		☐	☐	☐
Czy stosujesz środki uwalniające tlenek azotu tzw. poppers?		☐	☐	☐
Czy stosujesz leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne, stosowane w leczeniu przerostu prostaty lub nadciśnienia ? Mogą to być:		TAK	NIE WIEM	NIE
1. alfuzosyna (np. Alfabax)		☐	☐	☐
2. doksazosyna (np. Cardura, Doxar)		☐	☐	☐
3. tamsulosyna (np. Omnic)		☐	☐	☐
Czy przyjmujesz leki stosowane w nadciśnieniu płucnym ? Mogą to być:		TAK	NIE WIEM	NIE
1. riocyguat (np. Adempas)		☐	☐	☐
2. syildenafil (np. Revatio)		☐	☐	☐
Czy przyjmujesz inhibitory CYP3A4 takie jak:		TAK	NIE WIEM	NIE
1. sakwinawir (np. Invirase) lub rytonawir (np. Norvir), stosowany w leczeniu zakażenia HIV		☐	☐	☐
2. itraconazol (np. Ipozumax, ItraGen, Itrax) lub ketokonazol (np. Ketoconazole HRA) stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych lub zespołu Cushinga (nadmierne wytwarzanie kortyzolu w organizmie)		☐	☐	☐
3. erytromycyna (np. Davercin) - antybiotyk		☐	☐	☐
Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?		TAK	NIE WIEM	NIE
1. zdiagnozowano u Ciebie jakąkolwiek chorobę układu krążenia (np. wada zastawki serca, kardiomiopatia, jakiekolwiek arytmie, dysfunkcja lewej komory, ...)		☐	☐	☐
2. przeszedłeś operację sercowo-naczyniową (np. pomostowanie, stenty, angioplastyka, ...)		☐	☐	☐
3. masz niskie ciśnienie krwi (poniżej 90/50 mmHg)		☐	☐	☐
4. masz wysokie ciśnienie krwi (powyżej 150/90 mmHg)		☐	☐	☐
5. aktywność fizyczna o niskiej lub średniej intensywności powoduje silną duszność lub ból w klatce piersiowej (np. 20-minutowy szybki marsz lub wchodzenie na drugie piętro)		☐	☐	☐
6. w ostatnich 6 miesiącach przeszedłeś zawał serca lub udar mózgu		☐	☐	☐
7. występuje u Ciebie niestabilna dusznica bolesna lub ciężka niewydolność serca		☐	☐	☐
8. w przeszłości doszło u Ciebie do utraty przytomności przy gwałtownej zmianie pozycji ciała		☐	☐	☐
9. masz anatomiczną deformację prącia (zwłóknienie ciał jamistych) lub rozpoznaną chorobę Peyroniego		☐	☐	☐
10. stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji niż leki zawierające sildenafil		☐	☐	☐
11. leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV		☐	☐	☐
12. utraciłeś wzrok w jednym oku z powodu choroby zwanej NAION (przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego bez zapalenia tętnic)		☐	☐	☐
13. rozpoznano u Ciebie dziedziczne zaburzenia funkcji siatkówki oka (takie jak tzw. zwyrodnienie barwnikowe)		☐	☐	☐
14. rozpoznano u Ciebie rzadko występujące, dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkową)		☐	☐	☐
15. rozpoznano u Ciebie ciężką niewydolność fukcji wątroby		☐	☐	☐
16. masz chorobę wrzodową		☐	☐	☐
17. stwierdzono u Ciebie ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia)		☐	☐	☐
18. rozpoznano u Ciebie białaczkę (choroba nowotworowa krwi)		☐	☐	☐
19. stwierdzono u Ciebie szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)		☐	☐	☐
20. masz ciężką niewydolność nerek		☐	☐	☐



PAMIĘTAJ!

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz stosować lek Sildenafil Dr. Max lub masz problem z doбором dawki, przed zastosowaniem leku skonsultuj się z farmaceutą.

Problemy ze wzrodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzrodu. Występowanie zaburzeń wzrodu jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym chorób serca. Dlatego należy poinformować lekarza najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia zaburzeń erekcji i rozpoczęcia przyjmowania leku Sildenafil Dr. Max. Jeśli objawy zaburzeń erekcji nie ustąpią po kilku kolejnych próbach podjęcia aktywności seksualnej po przyjęciu leku Sildenafil Dr. Max lub jeśli zaburzenia erekcji nasila się, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.